

RESTRICTIONS D'UTILISATION DES CORRECTEURS D'ÉTAT FONCTIONNEL (CEF)



1. **Ne pas porter le CEF directement sur la projection de la source d'alimentation d'un stimulateur cardiaque**, car cela pourrait raccourcir la durée de vie de la batterie du stimulateur. Cependant, le CEF peut être porté sur d'autres parties du corps sans problème.



2. **Ne pas porter le CEF pendant des interventions chirurgicales sous anesthésie**, car il réduit considérablement les effets de l'anesthésie. Il est préférable de ne pas utiliser le CEF pendant cette période.



3. **Ne pas porter le CEF pendant des examens électrophysiologiques tels que l'électrocardiographie (ECG) ou l'électroencéphalographie (EEG)**, car cela peut fausser les résultats de l'examen. Il est préférable de retirer le CEF avant ces examens.



4. **En cas de maladies chirurgicales aiguës nécessitant une intervention chirurgicale d'urgence, il est déconseillé de porter le CEF** sur soi pendant cette période.



5. **En cas de calculs dans différents organes, en particulier dans la vésicule biliaire, il est recommandé de ne pas porter le CEF en permanence**, mais de doser son utilisation avec prudence.



Il est cependant important de noter que même si le port du CEF est déconseillé dans ces situations spécifiques, **il est toujours recommandé de boire de l'eau structurée à l'aide du CEF**, car cela peut apporter des bienfaits.

De plus, **les CEF peuvent perdre leur efficacité si vous suivez un traitement immunosuppresseur**, comme après une transplantation d'organe, car l'effet du traitement va à l'encontre de l'action des CEF.

Il est essentiel de prendre en compte ces restrictions pour une utilisation sûre et appropriée des CEF.